


サッチ分解と病害抑制のケイ酸総合液肥

THE HARD BANG

ハードバン



成分

水溶性 ケイ酸	水溶性 加里	キレート 鉄	腐植酸	糖分	その他	好熱菌(ホウジョウ菌)
17%	4%	0.1%	0.1%	6%	苦土 マンガン ホウ酸	6.9×10^8

2kg (1.5ℓ) × 10本入





サン化研株式会社

サッチ分解と病害抑制のケイ酸総合液肥

THE HARD BANG

ハードバン


—ハードバンの効果—



芝のサッチが好熱菌(バクテリアホウジョウ)で分解実写



好熱菌 (バクテリアホウジョウ) の実写



悪玉菌(病害菌)を抑える
善玉菌(好熱菌=バクテリアホウジョウ)実写

—特徴—

1. ケイ酸効果

あらゆる作物の葉茎をケイ化細胞(シリカ層)にさせて、強靱にします。

2. サッチ(未分解有機物)の分解効果

含有好熱菌(バクテリアホウジョウ)の酵素セルラーゼがセルロースを分解、醗化した土壤にします。

3. 病害抑制(善玉菌化)の効果

含有好熱菌(バクテリアホウジョウ)の酵素キナーゼが悪玉菌(主として糸状菌)のキチン厚膜を分解開裂させ、毒素(DL-リンゴ酸、アセチルCaA、グリオキシル酸等)を放出させ善玉菌になって病害を抑制します。

—使用方法—

・芝生の場合

タンク車(水1000ℓ)に、ハードバン2kg(1本)を入れて500倍液とします。

散布量のかための芝作り、サッチ分解、病害予防等の目的に応じて.....

250~500cc/㎡ 散布をお奨めします。

・蔬菜、果樹、花卉の場合

動霧タンク(水500ℓ)にハードバン1kg(1/2本)を入れて500倍液とし、10a当り300ℓに葉面表裏に散布して下さい。時期は、例えばイチゴのうどんこ病予防や炭疽病予防の場合、発生が予想される10~15日前に散布して下さい。(生育期間中3~4回散布を繰り返す)

※又、畑地灌水施用にもお奨めします。

原則、500倍液を慣行施用水量に合わせて下さい。